

<분류번호 141>

메퀴타진 (Mequitazine)

▶효능·효과

(정제)(시럽제)

두드러기, 고초열, 알레르기 비염, 가려움, 결막염

▶용법·용량

(시럽제)

소아 : 이 약으로서 1일 체중 5 kg당 1.25 mg를 경구투여한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

▶사용상의 주의사항

(정제)(시럽제)

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 페노티아진계 약물 및 그 유사화합물에 과민반응 환자
- 2) 녹내장환자(항콜린작용에 의함)
- 3) 전립선비대 등 하부요로 폐색성 질환환자(항콜린작용에 의함)
- 4) 혼수상태 환자 또는 바르비탈계 약물, 마취제 등 중추신경억제제를 대량 투여중인 환자
- 5) MAO억제제를 투여중인 환자
- 6) 간질 환자
- 7) 간염 환자
- 8) 2세 미만 영아(시럽제에 한함)
- 9) 이 약에 알레르기 증상의 병력이 있는 환자
- 10) 선천적 긴 QT 증후군 환자
- 11) QT간격이 길거나 전해질 불균형 환자(특히 저칼륨증 환자)

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 신장장애 환자
- 2) 간장애 환자
- 3) 협착성 소화성 궤양 또는 유문십이지장 폐색 환자
- 4) 급성 알코올 중독 환자

- 5) 유문십이지장 궤양 환자
- 6) 조혈장애 환자
- 7) 천식, 기관지염, 기관지확장증 등 하기도 질환 환자
- 8) 수면무호흡증의 병력 환자
- 9) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 10) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분이 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 이상반응

- 1) 과민반응 : 드물게 발진, 광민감반응, 피부반응(독성, 알레르기) 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다. 복용 후 곧바로 두드러기, 부종, 가슴쓰림 등과 동시에 안색창백, 수족냉감, 식은 땀, 숨가쁨 등 쇼크(아나필락시스)이 나타날 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사의 진료를 받는다.
- 2) 간 : 드물게 전신피로, 황달, ALT, AST 상승, 담즙울체가 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 3) 혈액 : 드물게 조혈장애로 혈소판 감소가 나타나 코출혈, 잇몸출혈, 청색반점 등의 출혈증상이 나타날 수 있으므로 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지한다.
- 4) 정신신경계 : 때때로 졸음, 권태감, 어지럼, 드물게 두통, 정신착란, 흥분, 불안이 나타날 수 있다.
- 5) 소화기계 : 때때로 구갈, 위부불쾌감, 드물게 설사, 위통, 식욕부진, 구역, 구토, 변비, 복통 등이 나타날 수 있다.
- 6) 순환기계 : 드물게 흉부불쾌감, 심계항진, 저혈압이 나타날 수 있다.
- 7) 비뇨기계 : 드물게 배뇨곤란 등이 나타날 수 있다.
- 8) 안과질환 : 원근조절장애, 산동
- 9) 심장 질환 : 토르사드 드 포인트(torsade de pointes)
- 10) 피부 및 피하조직 : 감광성 반응, 홍반, 습진, 가려움, 자반증, 두드러기, 혈관 신경부종
- 11) 기타 : 드물게 인후통, 월경이상, 미각이상, 구내마비감이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

졸음이 올 수 있으므로 이 약을 투여중인 환자는 자동차운전 등 위험한 기계조작에 종사하지 않도록 주의한다.

5. 상호작용

- 1) 바르비탈계 약물, 마취제, 마약성 진통제 또는 정신안정제 등의 중추신경 억제제, 항우울약, 혈압강하제 또는 아트로핀모양 작용을 나타내는 약물과 병용 또는 알코올 섭취에 의해 상호 작용이 증가될 수 있으므로 감량하는 등 신중히 투여한다.
- 2) 중증의 심박 장애는 병용 약물의 수, 항부정맥제의 여부에 따라 발생할 수 있으므로 토르사드 드 포인트(torsade de pointes)를 일으킬 수 있는 약물은 병용하지 않는다.
- 3) 요저류, 녹내장, 변비, 입마름 등의 이상반응 발생을 촉진시키는 아트로핀 약물은 병용하지 않는다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임부 : 임신 중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 투여하지 않는다.
- 2) 수유부 : 동물실험에서 이 약이 유즙으로 분비되었다는 보고가 있으므로 투여 중에는 수유를 중지한다.

7. 소아에 대한 투여

- 1) 소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다(사용경험이 적다).
- 2) 다른 페노티아진계 약물을 소아(특히 2세 미만)에 투여한 경우 유아돌연사증후군(SIDS) 및 유아 수면시 무호흡발작이 나타났다는 보고가 있다.

8. 과량투여시의 처치

과량 투여시의 증상은 무기력, 구역, 구토가 나타나며 이러한 증상이 나타날 경우에는 인공호흡, 항경련성 치료, 위세척 또는 지지요법을 한다.