

일반의약품

약효분류:114 해열,진통,소염제

012612

해열·두통·치통·생리통에

헤데카® 정

헤데카®정은 진통·해열 성분에 이들의 작용을 돕는 성분을 배합한 Synergism(협력작용) 개념의 복합 처방 진통·해열제이다.
두통·치통·생리통 등의 통증 및 오한, 발열에 뛰어난 효과를 나타낸다.

【원료약품 및 그 분량】1정 중

에텐자미드(KP)	225mg
아세트아미노펜(KP)	150mg
카페인무수물(KP)	13mg
티아민질산염(KP)	5mg
브롬발레릴우레아(KP)	80mg
첨가제(동물유래):유당수화물(기원동물:포유류, 사용부위:젖), 젤라틴(기원동물:소, 사용부위:가죽)	

【성상】백색의 정제

【효능·효과】

- 두통, 치통, 월경통(생리통), 발치 후 통증(이를 뽑은 후 통증), 신경통, 요통, 근육통, 건통(어깨통증), 인후(목구멍)통, 이통(귀통증), 관절통, 타박통, 골절통, 염좌통(뺨 통증), 외상(상처)통의 진통
- 오한(춥고 떨리는 증상), 발열시의 해열

【용법·용량】

15세 이상 성인 : 1회 2정, 1일 2회, 가능한 공복(빈 속)을 피하여 물과 함께 복용한다.

6시간 이상의 간격을 두고 복용한다.

7세 이상~15세 미만 : 각 1회량 및 1일량은 15세 이상 성인량에 다음의 수치를 곱한량으로 한다.

7세~10세: 1/2 11세~14세: 2/3

【사용상의 주의사항】

1. 경고

매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의 해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.

2. 다음 사람은 복용하지 말 것

- 1) 지금까지 이 약에 의한 과민증상[예를 들면 발진, 발적(총혈되어 붉어짐), 가려움, 부종(부기)(후두, 눈꺼풀, 입술 등)]을 일으킨 적이 있는 사람
- 2) 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람
- 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.

3. 다음 사람은 복용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것

- 1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 기관지천식, 알레르기성비염, 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영유아 및 14세 이하의 어린이
- 4) 간장·신장·감상선질환, 당뇨병·고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 5) 고령자(노인)
- 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
- 7) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람

4. 복용할 때 다음 사항을 주의할 것

- 1) 용법·용량을 잘 지킬 것
- 2) 다음 약들과는 동시에 복용하지 말 것 : 다른 해열진통제, 감기약, 진정약 등
- 3) 어린이에게 복용시킬 경우는 보호자의 책임하에 복용시킬 것

5. 복용중 또는 복용후에는 다음 사항을 주의할 것

- 1) 복용하는 동안 발진, 발적(총혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 현기증(머지러움) 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것
- 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다고 보고되어 있으므로 이와 같은 증상이 나타나 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담할 것
 - ① 이 약의 복용후 곧바로 두드러기, 부종(부기)(후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백해지고, 손발이 차가워지고, 식은땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우

② 고열을 수반하며 발진, 발적(총혈되어 붉어짐), 화상모양 수포 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우

③ 천식이 나타난 경우

3) 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다. 알코올은 아세트아미노펜 과량 투여의 간독성을 증가시킬 수 있다.

4) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전조작을 피할 것

5) 여러차례 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것

6) 장기연용(장기적으로 계속 사용)하지 말 것

6. 보관 및 취급상의 주의


- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관할 것
- 2) 직사일광을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것
- 3) 오용(잘못된 사용)을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

【포장단위】자사포장단위

【저장방법】밀폐용기, 실온보관

안전포장 개봉방법

헤데카®정은 어린이의 잘못된 의약품 사용으로 인한 약물 사고를 방지하기 위해 어린이 보호용 안전포장(Children Resistance: CR)을 적용하였으며, 반드시 개봉방법을 숙지하신 후 복용하시기 바랍니다.



※볼록한 부분을 강하게 눌러 1정만 꺼내 복용합니다.

※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전청(이지드럭 → 보고마당 → 안전성정보 → 의약품유해사례보고)에 알리도록 하십시오.

※ 이지드럭(ezdrug.kfda.go.kr)의약품 정보 참조

※ 만일, 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되었거나 손상된 제품이 발견된 경우에는 약국 개설자 및 의약품 판매업자에 한하여 교환해 드립니다.

제조·판매
부광약품주식회사
경기도 안산시 단원구 목내동 470

국민 건강을 위해 꾸준히 노력해 온 저희 부광약품은 소비자의 편의를 위해 **부광약품이 통화료를 부담**하는 소비자 상담실을 운영하고 있습니다. 제품 문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 지금 전화해 주십시오.

☎ 소비자 상담실 : TEL. 080-833-2233 ☎ 홈페이지 : <http://www.bukwang.co.kr>

※ 이 첨부문서 작성일자(2012년 1월 26일)이후 변경된 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.