

헥사메딘액 0.12%

(클로르헥시딘글루콘산염액)

삼키지 마세요

※ 사용 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

【원료약품 및 그 분량】 100mL 중,

유효성분 : 클로르헥시딘글루콘산염액(EP)·····0.6mL
(클로르헥시딘글루콘산염으로서 0.12g)
첨가제 : 농글리세린, 에탄올, 정제수, 정향유조합향, 폴리옥실40경화피마자유, 효소처리스테비아

【성상】

무색 투명한 액제로서 방향성을 지니고 있다.

【효능·효과】

1. 주효능 효과
다음 질환에 의한 염증의 완화:
보철(의치)에 의한 염증, 아구창 등의 구강내 칸디다감염증, 치은염, 인두염, 아프타성 구내염
2. 다음 질환에도 사용할 수 있다.
치근막 수술 후 살균소독

【용법·용량】

1회 15mL 1일 2회 약 1분동안 양치질하며, 의치로 인한 구내염의 경우에는 의치를 1일 2회 15분간 담가 세척한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고
구강내 정상 세균총(세균집단)의 불균형을 유발할 수 있으므로 장기간 투여하지 않는다.
2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
이 약에 과민증의 병력이 있는 환자
3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
천식 등 알레르기 질환이 있거나, 이러한 병력 또는 가족력이 있는 환자
4. 부작용
1) 구강
치아나 구강표면에 착색 증가, 치은연상치석 형성 증가, 미감각의 변화 등이 나타났다. 특히 소아에서 구강점막의 표피탈락, 경미한 자극이 보고된 바 있다.
2) 속
드물게 속증상이 일어날 수 있으므로 충분히 관찰하고 구역, 불쾌감, 식은 땀, 어지러움, 답답함, 호흡곤란, 발작 등이 나타날 경우에는 즉시 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
3) 과민증
때때로 발진, 두드러기 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
4) 기타
클로르헥시딘 함유 구강세척제에서 일시적인 이하선염이 보고된 바 있다.

5. 일반적 주의

- 1) 일반적인 세균감염시에는 항생물질을 투여하여야 한다.
- 2) 치료는 보통 10일을 넘지 않는다.
- 3) 치은염과 치주막염이 합병된 환자를 이 약으로 치료한 후, 치은염의 유무는 치주막염 치료의 중요한 판정기준으로 이용되서는 안된다.
- 4) 치아표면, 보철물, 혀의 뒷면과 같은 구강표면에 착색을 일으킬 수 있다.
- 5) 거친 표면이나 틈이 있는 안면정방의 보철물을 착용한 환자에는 신중히 투여해야 한다.
부과적인 예방에 의해 착색이 제거되기 어렵고, 드물게 보철물을 바꿔야 할 경우가 있으므로 착색되는 것을 원하지 않는 환자에는 투여하지 말아야 한다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임부에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회하는 경우에만 투여한다.
- 2) 모유로 이 약물이 이행되는지는 알려지지 않았으나, 많은 약물이 모유로 분비되므로 수유부에는 신중히 투여한다.

7. 소아에 대한 투여

18세 미만의 소아에 대한 유효성 및 안전성은 확립되어 있지 않다.

8. 적용상의 주의

함수용으로만 사용하고, 내복용으로 사용하지 않는다.

9. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
- 3) 화기에 가까이 두지 않는다.

【저장방법】

차광기밀용기, 상온(15~25°C) 보관

【포장단위】

100mL/병, 250mL/병,
6포[(15mL/포)×6], 14포[(15mL/포)×14]

※ 구내염 : 입안염, 치은염 : 잇몸염, 구강 : 입안

※ 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(<http://www.drugsafe.or.kr> → 의약품이상사례보고)에 알려도록 하십시오.

※ 부작용 피해 구제 신청은 한국의약품안전관리원(1644-6223)으로 문의하여 주시기 바랍니다.

※ 만일, 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오염되었거나 손상된 제품이 발견된 경우에는 약국 개설자 및 의약품 판매업자에 한하여 교환해 드립니다.

※ 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)의약품 정보 참조

제조의뢰자 :

 **부광약품주식회사**
경기도 안산시 단원구 능안로 47

제조사 :

 **Firson** (주)퍼슨
충남 천안시 서북구 백석공단1로 47

국민 건강을 위해 꾸준히 노력해 온 저희 부광약품은 소비자의 편의를 위해 부광약품이 통화료를 부담하는 소비자상담실을 운영하고 있습니다. 제품 문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 지금 전화해 주십시오.

♣ 소비자상담실 : TEL 080-933-2233 <http://www.bukwang.co.kr>

※ 이 첨부문서 작성일자(2021년 5월 10일)이후 변경된 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.

