

일반의약품

뮤코론[®] 캡슐 375mg

Mucolon[®] capsule 375mg

L-카르보시스테인

500캡슐

약효분류 : 222 진해거담제

코안에서부터 기관지까지에 이르는 호흡기는 점막층으로 덮여 있으며, 점액섬모이동기전(mucociliary transport mechanism)에 의해 기관은 적절한 수분을 유지 할 수 있고, 외부로부터 들어오는 먼지, 각종 세균, 바이러스, 공해물질은 점액에 부착되어 이들로 부터 기관은 보호되고 있다. 그러나, 이와 같은 점액의 세정작용에 이상이 생기면, 폐기관지 질환이 유발된다. 점액분비가 많아지고, 점액의 부착력과 점도가 변화되어 유해물질들을 제거하지 못하고, 점액저류·섬모기능 저하등의 현상이 일어나며, 그에 따라 세균감염의 위험율이 높아져 급성 또는 만성 폐기관지 감염증을 일으키게 되는 것이다. 그러므로, 호흡기 및 비인후 질환의 모든 치료에는 점막의 기능 회복과 점액의 정상화가 우선적으로 선행되어야 하는 근본적인 치료방법이다. L-카르보시스테인은 객담(가래)을 녹이는 작용과 점막기능 정상화 작용이 우수한 성분으로, 점액상피세포의 기능을 회복시켜며 객담(가래)을 녹여 호흡을 용이하게 하고, 손상된 점막을 재생시켜 호흡기 및 비인후 질환을 치료하여 준다.

제조번호:

사용기한:

일반의약품 정보

【유효성분】	1캡슐 중
L-카르보시스테인(KP)	375mg
【효능·효과】	
1. 다음 질환에서의 객담(가래)배출곤란 : 급·만성기관지염, 기관지천식, 기관지확장증, 인두염	
2. 만성부비동염의 배농	
【용법·용량】	
성인 : L-카르보시스테인으로서 초기에 1회 750mg 1일 3회 복용하고 증상이 나아지면 1회 375mg 1일 4회 복용한다.	
【사용상의 주의사항】	
1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. / 1) 위·십이지장 궤양 환자 2) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응 환자 3) 2세 미만 소아	
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것. / 1) 간장애 환자 2) 심장애 환자 3) 위·십이지장 궤양의 병력이 있는 환자 4) 임부 : 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 투여하지 않는 것이 바람직하다. 특히 임신 3개월 이내에는 투여가 권장되지 않는다. 5) 수유부 : 수유부에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 수유부에는 투여하지 않는 것이 바람직하다. 6) 고령자 : 일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량줄임하는 등 신중히 복용할 것.	
3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약	▶

【약리작용】

1. 기관지 분비세포의 점액합성 과정을 정상화 : 손상된 점막의 재생을 촉진하며, 점액 합성에 관여하는 효소 sialyl-transferase를 활성화시켜 점액을 양적·질적으로 정상화 한다.

사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. / 1) 소화기계 : 드물게 구역, 구토, 복부(배부분)팽만감, 위장관출혈, 가슴쓰림, 때때로 식욕부진, 위부불쾌감, 설사, 구갈(목마름) 등. 민감한 환자에서 구내염(입안염) 2) 과민반응 : 때때로 발진, 홍반(붉은반점), 습진 등 3) 신경계 : 드물게 두통 4) 호흡기계 : 민감한 환자에서 비염(코염) 5) 기타 : 때때로 가려움, 심계항진(두근거림), 콧물, 전신의 압박감 6) 피부점막안증후군(스티븐스-존슨 증후군), 독성표피괴사증후군(리엘레 증후군) 7) AST, ALT, ALP, LDH 상승 등을 동반한 간기능장애, 황달 8) 쇼크, 아나필락시스모양 반응 9) 14일 이상 기침이 계속되는 경우

4. 기타 이 약을 복용시 주의할 사항 / 1) 과량 복용시 위세척이 유익하며, 위장장애가 가장 흔한 증상이다.

5. 저장상의 주의사항 / 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관할 것. 3) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 보관할 것.

【저장방법】	
기밀용기	
【사용기한】	
좌측하단 표시일까지	
【첨가제】	
첨가제(타르색소) : 청색 1호, 황색 203호 기타 첨가제 : 경질캡슐, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘	

2. 객담(가래)을 녹이는 작용 : 과잉 분비되어 응고된 객담(가래)의 이온결합력을 감소시키고, disulfide bond를 직접 파괴하여 객담(가래)을 녹여서 배출이 용이하도록 해준다.

3. 점액저류를 감소시키고, 기관·기관지의 점막비대를 개선시킨다.

4. 복용후 신속히 흡수되어 약효발현이 신속하다.

【성상】 상단 녹색, 하단 흰색 캡슐 내의 흰색 분말임.
【포장단위】 500캡슐/병

- ※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(<http://www.drugsafe.or.kr> → 의약품유해사례보고)에 알리도록 하십시오.
- ※ 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의약품 정보 참조
- ※ 만일, 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품이 발견된 경우에는 약국개설자 및 의약품 판매업자에 한하여 교환해 드립니다.



(01) 0880642205041



제조·판매 010318
부광약품주식회사
경기도 안산시 단원구 능안로 47

국민 건강을 위해 꾸준히 노력해 온 저희 부광약품은 소비자의 편의를 위해 부광약품이 통화료를 부담하는 소비자 상담실을 운영하고 있습니다. 제품 문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 지금 전화해 주십시오.

♣ 소비자 상담실: TEL 080-933-2233
<http://www.bukwang.co.kr>

※ 이 첨부문서 작성일자(2018년 01월 03일) 이후 변경된 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.