

제품명: 코리투살에프콜드시럽

용법·용량

다음의 1회 용량을 1일 3회, 매 식후 및 필요한 경우에는 취침 시 복용한다.
원칙적으로 복용 간격은 4시간 이상으로 한다.

만 15세 이상 20mL

만 11세 이상 - 만 15세 미만 13.33mL

만 7세 이상 - 만 11세 미만 10mL

만 3세 이상 - 만 7세 미만 6.67mL

만 2세 이상 - 만 3세 미만 5mL

만 2세 미만에게 투여하지 않는다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받는다.

변경대비표

기 허 가 사 항	변 경 사 항
<p>다음의 1회 용량을 <u>1일 4회</u>, 매 식후 및 필요한 경우에는 취침 시 복용한다. <u>일반적으로</u> 복용 간격은 4시간 이상으로 한다.</p> <p>15세 이상 <u>15mL</u> 11세 이상 - 15세 미만 <u>10mL</u> 7세 이상 - 11세 미만 <u>7.5mL</u> 3세 이상 - 7세 미만 <u>5mL</u> 2세 이상 - 3세 미만 <u>3.75mL</u></p> <p>만 2세 미만에게 투여하지 않는다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받는다.</p>	<p>다음의 1회 용량을 <u>1일 3회</u>, 매 식후 및 필요한 경우에는 취침 시 복용한다. <u>원칙적으로</u> 복용 간격은 4시간 이상으로 한다.</p> <p><u>만</u> 15세 이상 <u>20mL</u> <u>만</u> 11세 이상 - 만 15세 미만 <u>13.33mL</u> <u>만</u> 7세 이상 - 만 11세 미만 <u>10mL</u> <u>만</u> 3세 이상 - 만 7세 미만 <u>6.67mL</u> <u>만</u> 2세 이상 - 만 3세 미만 <u>5mL</u></p> <p>만 2세 미만에게 투여하지 않는다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받는다.</p>