

위염·위궤양 치료제

셀벡스® 캡슐

(테프레논)

SELBEX® 캡슐
(Teprenone)

전문의약품

약효분류 : 232 소화성 궤양용제

010218

원료약품 및 그 분량

1캡슐 중

유효성분 : 테프레논(JP) 50mg

- 일반명 : 테프레논 (Teprenone)
- 화학명 : 3:2 (5E:5Z) geometrical mixture of (9E,13E)-6,10,14,18-tetramethyl-5,9,13,17-nonadecatraen-2-one
- 분자식 : C₂₃H₃₈O
- 분자량 : 330.55
- 굴절률 : n_D²⁰: 1.485~1.491
- 비중 d₄²⁰: 0.882~0.890

첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(기원동물: 소, 사슴부위: 젖) / 첨가제(타르색소) : 청색1호, 황색5호
기타 첨가제 : 옥수수전분, 캡슐, 락트, 토크메롤, 폴리메틸렌글리콜6000, 합수이산화규소

성상

이 약은 흰색~미황백색의 과립 및 분말이 든 상부 회청록색, 하부 담등색의 불투명한 경질캡슐제이다.

효능·효과

- 위궤양
- 다음 질환의 위점막 병변(미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선 : 급성위염, 만성위염의 급성악화기

용법·용량

성인 : 테프레논으로서 1일 150mg을 3회 분할 식후에 경구투여한다. 연령·증상에 따라 적절히 증감한다.

사용상의 주의사항

- 다음의 환자에는 투여하지 말 것
이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것
이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 부작용
(1) 소화기계 : 드물게 변비, 복부팽만감, 설사, 구갈, 구역, 복통 등의 증상이 나타날 수 있다.
(2) 간장 : 때때로 GOT, GPT 치의 가벼운 상승이 나타날 수 있다.
(3) 정신신경계 : 드물게 두통 등의 증상이 나타날 수 있다.
(4) 피부 : 드물게 발진, 전신가려움증 등의 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.
(5) 기타 : 드물게 총 콜레스테롤치의 상승, 안검의 발적, 열감이 나타날 수 있다.
- 임부에 대한 투여
임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
- 소아에 대한 투여
소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다. (사용경험이 없음)

저장방법

기밀용기, 실온보존(1~30℃)

포장단위

100캡슐(10캡슐/PTP x 10), 500캡슐/병



Eisai Co., Ltd.
4-6-10 Koishikawa,
Bunkyo-ku, Tokyo
JAPAN 112-8088

제조의뢰자
부광약품주식회사
경기도 안산시 단원구 능안로 47

제조자
씨제이헬스케어주식회사
충청북도 정주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 239

국민 건강을 위해 꾸준히 노력해 온 저희 부광약품은 소비자의 편의를 위해 부광약품이 통화료를 부담하는 소비자 상담실을 운영하고 있습니다.
제품 문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 지금 전화해 주십시오.
◆ 소비자 상담실 : TEL .080-933-2233 http://www.bukwang.co.kr

- 이 첨부문서 작성일자(2018년 01월 02일)이후 변경된 내용은 <http://www.bukwang.co.kr> 또는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>) ▶ 의약품검색에서 확인할 수 있습니다.
- 만약, 유통과정 중 잘못으로 인하여 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염되었거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환해 드립니다.
- 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국약품안전관리원(<http://www.drugsafe.or.kr>)
▶ (의약품 유해사례 보고)에 알리도록 하십시오.
- 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 보관하십시오.
- 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 처방된 증상, 처방된 환자 이외에는 사용하지 마십시오.
- 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.