

일반의약품 | 분류번호: 235 최도제, 진도제



원료약품 및 그 분량 (병 30ml 중)
 메클리진염산수화물(KP) -- 25mg, 클로르페니
 라민일레산염(KP) -- 2mg, 피리독신염산염(KP)
 10mg, 카페인무수물(KP) -- 25mg, 첨가제(보조제):
 피리옥시벤조산프로필(KP) -- 0.9mg, 피리옥시벤
 조시메틸(KP) -- 2.1mg **성상** 콜라량이 있는 무색
 또는 미색의 투명한 액 **【효능·효과】** 알기에 의한
 어지러움·구토·두통의 예방 및 완화 **【용법·용
 량】** 성인: 말미의 여량에는 승차 또는 승선 30분전
 에 성인 1회 1병을 복용한다. 또 필요시 추가 복용
 할 경우에는 4시간 이상의 간격을 두고 복용한다.
 1일 복용횟수는 1일 3회를 한도로 한다. **【사용상의
 주의사항】** 1. 다음 환자에는 신중히 투여할 것./1)

이로 알레르기 증상 발진 발적 총혈되어 불
 어짐, 가려움 등을 일으키는 일이 있는 환자/2
 일부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인/3
 투여 또는 통증, 눈의 침침함 등 배뇨소변을
 남는 장애가 있는 환자/4 다른 약물을 투여받고 있는 환자
 2부작용 /1이 약을 투여함으로써 발진 발적 총
 혈되어 붉어짐, 가려움 등의 증상이 나타날 경우
 에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하
 다. 2이 약을 투여함으로써 배뇨소변을 남는 것
 에움이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사
 또는 의사와 상의한다. 3이 약을 투여함으로써
 구갈, 목이 따가움 등이 나타날 수 있다. 4 일반적 주의/
 1정해진 용법·용량을 잘 지켜다. 2가소이에게
 투여하지 않는다. 3이 약에 의해 졸음이 나타날
 수 있으므로 자동차 운전 등 위험이 수반되는 기
 계 조작을 하지 않도록 주의한다. 4 상호작용 /다
 음의 약물과 병용할 때 투여하지 않는다. / 다른 시
 투제, 간약, 해열진통제, 항히스타민제, 진정제,
 진해거담제(가침)레약 5 저장상의 주의사항/
 1가소이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다. 2 직사

일광을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀
 전하여 뚜껑을 꼭 닫아 보관한다. 3 용량 조절 못된
 사용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에
 바꾸어 넣지 않는다.
【포장단위】 자시포장단위
【저장방법】 차광기밀용기, 실온(1~30℃) 보관



※ 소비자상담실: TEL. 080-833-2233
 ※ 온라인의약품도서관(<http://drug.mids.go.kr/>)
 의약품정보조회

제조번호: 15003
 사용기한: 2018. 06. 09

부광약품주식회사

제조의뢰자: 부광약품(주)
 경기도 안산시 단원구 능인로 47
 제조자: 삼성제약(주)
 경기도 화성시 향남읍 제약공단 2길 35

(01)08806422005522

060415