

일반의약품

약효분류 : 229 기타의 호흡기관용약

081414

기침감기약

코리아살[®]

코프시럽

【원료약품 및 그 분량】 100ml 중

dL-메틸에페드린염산염(KP)	125mg
구아이페네신(USP)	500mg
리소짐염산염(KPC)	100mg
덱스트로메토르판브로화수소산염수화물(USP)	100mg
첨가제(보존제): 파라옥시벤조산메틸(KP)	90mg
첨가제(보존제): 파라옥시벤조산프로필(KP)	10mg

【성상】 바나나향이 나는 단맛의 무색 또는 미황색의 투명한 시럽제

【효능·효과】 기침, 가래, 천식

【용법·용량】 다음의 1회 용량을 1일 5-6회 복용한다. 약 4시간 간격을 두고 복용한다.

- 만 15세 이상 : 10mL
- 만 11세 이상 - 만 15세 미만 : 6.67mL
- 만 8세 이상 - 만 11세 미만 : 5mL
- 만 5세 이상 - 만 8세 미만 : 3.33mL
- 만 3세 이상 - 만 5세 미만 : 2.5mL
- 만 2세 이상 - 만 3세 미만 : 2mL

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 만 3개월 미만의 영아
 - 2) 이 약 및 이 약의 구성성분 또는 달걀에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
 - 3) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것.

다른 진해거담제, 감기약, 항히스타민제를 함유하는 내복약(염용 경구제, 멀미약, 알레르기용약), 진정제
3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것.
 - 1) 만 3개월 미만의 영아에는 복용을 피하고 만 3개월 이상인 경우도 만 2세 미만의 영·유아는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 이약을 복용시키지 않도록 한다. 만 2세 미만 영·유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터링해야 한다.
 - 2) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 알레르기성비염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
 - 3) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
 - 4) 간장질환, 신장질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 고령자, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
 - 5) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
 - 6) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
 - 7) 다음과 같은 기침이 있는 사람
 - 흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 처방문서를 소지할 것.
 - 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
 - 발진·발적, 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 어지러움, 불안, 떨림, 불면
 - 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증 증상이 나타난 경우
 - ① 속(아나필락시스): 복통후 바로 두드러기, 부종, 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다.
 - ② 피부점막만중후군(스티븐스-존슨증후군), 중증성표피괴사용해(리엘증후군) : 고열을 동반하고, 발진·발적, 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈점막에 나타날 수 있다.
 - 3) 5-6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
 - 2) 소아에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것.
 - 3) 복용시에는 음주하지 말 것.
6. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것
 - 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1-30℃)

【포장단위】 100ml

※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원 (<http://www.drugsafe.or.kr> → 의약품 유해사례보고)에 알리도록 하십시오.

※ 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의약품 정보 참조

※ 만일, 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 또는 오염되었거나 손상된 제품이 발견된 경우에는 약국 개설자 및 의약품 판매업자에 한하여 교환하여 드립니다.

부광약품주식회사

제조회사 : 부광약품(주) 경기도 안산시 단원구 능안로 47

제조자 : 한국백셀(주) 충남 천안시 서북구 성환읍 울금3길 46

국민 건강을 위해 꾸준히 노력해 온 저희 부광약품은 소비자의 편의를 위해 부광약품이 통화료를 부담하는 소비자 상담실을 운영하고 있습니다. 제품 문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 지금 전화해 주십시오.

☎ 소비자 상담실 : TEL 080-933-2233 <http://www.bukwang.co.kr>

※ 이 첨부문서 작성일자(2014년 8월 14일)이후 변경된 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.