

<분류번호 124>

페노베린 (Fenoverine)

▶효능·효과

(캡슐제)

과민성대장염, 월경통

▶용법·용량

(캡슐제)

성인 : 페노베린으로서 1회 100 mg을 1일 3회 식간에 경구투여한다. 환자의 상태에 따라 1회 200 mg까지 증량할 수 있다.

▶사용상의 주의사항

(캡슐제)

1. 경고

신부전 또는 간부전 환자에는 투여하지 않는다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약에 과민반응 환자
- 2) 마취중, 마취후 또는 운동후 고열, 악성 고열 환자
- 3) 미토콘드리아성 근장애 환자
- 4) 만성 간질환 또는 그 병력이 있는 환자(간경변, 급성 간염, 알코올성 간염, 만성 알코올남용자, 간암)
- 5) 12세 미만의 소아
- 6) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 60세 이상의 고령자
- 2) 여러 약물을 투여 받고 있는 환자

4. 이상반응

- 1) 소수의 환자에서 구갈, 변비, 위장장애가 나타날 수 있으나 용량조절로 소실된다.
- 2) 근육통, 탈력감, 크레아틴키나아제(CK) 상승, 혈중 및 요중 미오글로빈 상승을 특징으로 하는, 급격한 신기능악화를 수반한 횡문근융해증이 나타날 수 있으므로 주의한다.

5. 일반적 주의

- 1) 설명할 수 없는 근육통이 발생하거나 근병증으로 진단된 경우에는 치료를 중단하고 의사와 상의한다. 신부전을 초래할 수 있는 횡문근융해증의 발생 여부를 확인하기 위하여 크레아틴키나아제 수치를 확인하여야 한다. 이러한 근육증상의 발현으로 근육내 산화기전의 유전적 질환을 발견할 수 있다. 악성이상고열증에 대한 가족력을 확인할 수 있다.
- 2) 이 약이 운전 또는 기계조작에 영향을 미치는 영향에 대해 알려진바는 없으나, 구역, 어지럼(dizziness) 또는 운전이나 기계조작에 장애를 일으킬 수 있는 기타 이상반응이 나타날 경우 즉시 행동을 멈추고 의사와 상의하도록 한다.

6. 상호작용

다른 약물과의 상호작용은 보고되어 있지 않으나 주의깊게 임상증상을 관찰하면서 다른 약물과 병용투여한다.

7. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 투여하지 않는다.
- 2) 모유중으로의 이행에 대하여 연구되어 있지 않으므로 수유부에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.

8. 저장상의 주의사항

소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.