

# 코트리나

알레르기성 비염·코감기

※ 사용 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

## 【원료약품 및 그 분량】 이 약 1캡슐 중

유효성분 : 메퀴타진(JP) .....	1.33mg
벨라돈나총알칼로이드(JP)(히오스시아민으로서0.126mg) .....	0.13mg
글리시리진산이칼륨(KP) .....	20.00mg
슈도에페드린염산염(USP) .....	25.00mg
카페인무수물(KP) .....	50.00mg

첨가제(타르색소) : 적색3호, 적색40호, 청색1호

기타 첨가제 : 경질캡슐, 메타규산알루미늄사마그네슘, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘

## 【성상】

흰색 또는 미황색의 과립이 들어있는 상부 남색, 하부 탁한 파랑의 경질캡슐

## 【효능·효과】

코감기(급성비염), 알레르기성 비염 또는 부비강염에 의한 다음 증상의 완화

: 코막힘, 콧물, 재채기, 눈물, 목의 통증, 머리 무거움

## 【용법·용량】

성인(15세 이상) : 1회 1캡슐씩 1일 3회, 매 식후에 복용한다.

## 【사용상의 주의사항】

### 1. 경고

슈도에페드린 함유 의약품 복용시 급성 전신성 발진성 농포(고름 물집)증(AGEP)과 같은 중증 피부 이상반응이 나타날 수 있다. 발열, 홍반(붉은 반점), 다수의 작은 농포(고름 물집)와 같은 증상이 관찰될 경우 이 약의 복용을 중단하고 의사 또는 약사와 상의해야 한다.

### 2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 15세 미만 소아
- 2) 이 약 또는 이 약의 성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 3) 임부 및 수유부
- 4) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
- 5) 고혈압, 심장질환, 갑상선 기능장애, 당뇨병, 녹내장, 전립선 비대(배뇨(소변을 뚫)곤란), 신장 질환, 간질, 간염 환자
- 6) 고령자(65세 이상)

### 3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것.

다른 비염용 경구제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(감기약, 진해거담제, 멀미약, 알레르기용약 등)

### 4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것.

- 1) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 2) 감기약, 진해거담제, 비염용 내복약 등으로 불면증, 현기증, 약점, 떨림, 심장의 고동을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
- 4) 다음과 같은 기침이 있는 사람  
흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

### 5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우  
출혈성뇌졸중, 구역·구토, 목마름(지속적이거나 심한), 변비, 식욕부진, 발진·발적, 가려움, 배뇨(소변을 뚫)곤란, 두통, 안면 홍조, 비정상적인 눈부심

- 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증 증상이 나타난 경우
- ① 속(아나필락시): 복용후 바로 두드러기, 부종, 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다.
  - ② 급성 전신성 발진성 농포(고름 물질)증(AGEP), 발열, 홍반(붉은 반점), 다수의 작은 농포(고름 물질)와 같은 중증 피부 이상반응이 나타날 수 있다.
  - ③ 위알도스테론증: 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등이 나타날 수 있다.
  - ④ 근병증: 저칼륨혈증의 결과로서 근병증이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.
  - ⑤ 슈도에페드린 성분과 관련하여 허혈성 대장염의 증상(급격한 복통(배아픔), 직장 출혈 등)이 발현될 경우
- 3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

## 6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 장기간 계속 복용하지 말 것.
- 3) 15세 이상 소아에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것.
- 4) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것.
- 5) 복용 시에는 음주하지 말 것.
- 6) 과량투여 시 급성중독(환각 및 경련), 신경과민, 어지러움, 불면 등을 일으킬 수 있으므로 권장량 이상을 초과하지 않는다.

## 7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

### 【저장방법】

기밀용기, 실온보관(1~30°C)

### 【포장단위】

10캡슐/PTP

- ※ 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- ※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원 (<http://www.drugsafe.or.kr> → 의약품이상사례보고)에 알리도록 하십시오.
- ※ 부작용 피해구제 신청은 한국의약품안전관리원(1644-6223)으로 문의하여 주시기 바랍니다.
- ※ 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>) 의약품 정보 참조
- ※ 만일, 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되었거나 손상된 제품이 발견된 경우에는 약국 개설자 및 의약품 판매업자에 한하여 교환해 드립니다.

제조·판매



**부광약품주식회사**

경기도 안산시 단원구 능안로 47

국민 건강을 위해 꾸준히 노력해 온 저희 부광약품은 소비자의 편의를 위해 부광약품이 통화료를 부담하는 소비자 상담실을 운영하고 있습니다. 제품 문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 지금 전화해 주십시오.

♣ 소비자 상담실: TEL 080-933-2233 <http://www.bukwang.co.kr> ♣

※이 첨부문서 작성일자(2020년 04월 07일)이후에 변경된 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.