

일반의약품

약효분류 : 269 기타의 외피용약

081816

립독케어액

(폴리크레졸렌)

【원료약품 및 그분량】 1g 중

폴리크레졸렌(KP)720mg
(폴리크레졸렌으로서 360mg)

【성상】 적갈색의 맑은 외용액제

【효능·효과】

- 1) 산부인과 : 자궁경부의 염증 및 손상(박테리아, 트리코모나스에 의한 질대하, 비특이성질염, 자궁경관염, 페서리 사용에 의한 궤양)의 국소적 치료, 자궁 이소증의 국소적 치료, 자궁외부 미란(자무름)과 종양, 조직검사 및 자궁질 용종 제거 후의 지혈, 전기응고요법 후의 치료 촉진
- 2) 외과 및 피부과 : 작은 부위의 화상, 정맥류성 다리궤양, 욕창, 만성 염증에 의한 과사조직 박리 및 소독, 모세혈관 지혈
- 3) 이비인후과 : 이구창, 구내염, 치육염, 편도선 수술 후 및 비출혈의 지혈

【용법·용량】

- 이 약은 각각의 증상에 따라서 농축액 그대로 또는 희석하여 사용한다.
- 1) 질 및 자궁경부에의 직접적인 도포 및 국소 지혈 : 희석시키지 않고 사용하고 출혈부위를 1~2분간 누른다.
 - 2) 질세척 또는 질 관주육 및 이비인후과 : 이 약을 물과 1:5의 비율로 희석하여 사용한다.
 - 3) 외과 및 피부과 : 화상의 치료 또는 국소 지혈시에는 이 약을 직접 칠 지면 또는 거즈를 사용하여 비르고 해당부위를 1~2분간 누른다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
이 약 성분에 과민증 환자
2. 부작용
1) 치료 초기에 국소적인 자극 및 알레르기반응이 나타날 수 있다.
2) 강한 산성으로 인해 치아의 법랑질에 손상을 줄 수 있다.
3. 일반적 주의
1) 월경 중에는 사용하지 않는다.
2) 치료기간 중 성교를 하거나 자극적인 비누로 세척하지 않는다.
3) 이 약의 사용을 잊은 경우에는 용량을 보충하지 않고 그대로 다음 용량을 적용한다.
4. 상호작용
1) 이 약은 다른 외용제와 병용하여 사용하지 않는다.
2) 이 약은 콘돔, 질내 피임용격막과 같은 리텍스 또는 고무제품을 약 하시킬 수 있으므로 주의한다
5. 임부 및 수유부에 대한 투여
1) 동물실험에서 태자에 대한 위험성은 나타나지 않았으나 사람에게 대해 태이독성 및 기형발생을 유발하는지 여부에 대한 실험은 아직 실시되지 않았다.
2) 이 약을 임신 중, 특히 임신이 진행된 경우에 자궁경부에 직접 적용 하면 통증을 유발할 수 있으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유의성이 위험성을 상화한다고 판단 되는 경우에만 사용하고, 자궁 경부나 그 주위에 직접 적용시에는 적절한 보호 및 통제하에서 사용한다.
3) 이 약이 유즙으로 분비되는지의 여부는 알려지지 않았으나, 수유 부에는 신중히 투여한다.

6. 괴랑투여시의 처치

- 1) 증상 : 이 약을 마신 경우 식도가 손상될 수 있다.
 - 2) 처치 : 응급처치로 기도를 확보하면서 위세척을 하거나 위내용물을 제거하며 즉시 전문의의 진료를 받는다.
- ### 7. 적용상의 주의
- 1) 이 약은 국소적으로만 사용한다.
 - 2) 이 약은 강한 산성을 띠고 있으므로 눈에 들어가지 않도록 주의하고, 눈에 들어갔을 경우에는 즉시 깨끗한 물로 씻어낸 후, 의사 또는 약사와 상의한다.
 - 3) 이 약을 구강점막이나 잇몸에 적용한 후에는 철저히 입을 헹군다(액체에 한함).
- ### 8. 저장상의 주의사항
- 1) 이 약의 적용시 쓰이는 기구 등은 사용한 직후 소독할 때까지 물(경우에 따라 1~2% 탄산수소나트륨을 첨가)을 담은 용기에 보관한다.
 - 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 3) 이 약은 차광하여 보존한다.

【포장단위】 5mL/병

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(<http://www.drugsafe.or.kr> → 의약품유해사례보고)에 알리도록 하십시오.

※ 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의약품 정보 참조

※ 만일, 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되었거나 손상된 제품이 발견된 경우에는 약국 개설자 및 약약품 판매업자에 한하여 교환해 드립니다.



국민 건강을 위해 꾸준히 노력해 온 저희 부광약품은 소비자의 편의를 위해 **부광 약품이 통화료를 부담**하는 소비자 상담실을 운영하고 있습니다. 제품 문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 지금 전화해 주십시오.

♣ 소비자 상담실 : TEL 080-933-2233 <http://www.bukwang.co.kr>

※ 이 첨부문서 작성일자(2016년 8월 18일) 이후 변경된 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.