

111210

코감기엔-

# 타코나<sup>®</sup>노즈 캡슐

• 이 약을 사용하시기 전에 반드시 첨부문서를 주의깊게 읽어보시고, 첨부문서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

• 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

타코나<sup>®</sup>노즈캡슐은 네가지 성분이 상호보완적인 효과를 나타내는 복합제로서, 우수한 항콜린 작용과 항히스타민 작용을 통해 코감기(급성비염) 및 알레르기성 비염의 증상인 콧물, 눈물 등의 과도한 분비를 개선하고, 코막힘, 재채기, 인후통 및 머리 무거움 등의 증상 완화에 효과적인 제제입니다.

**【원료약품의 분량】 1캡슐 중**  
 클로르페니라민말레산염 (KP) ..... 4mg  
 벨라돈나총알카로이드 (별규) ..... 0.13mg  
 (히요스시아민으로서 0.1235mg)  
 페닐레프린염산염 (KP) ..... 3.33mg  
 염화리소진 (KPC) ..... 30mg  
 첨가제(동물유래):유당수화물(기원동물:포유류, 사용부위:젖)  
 첨가제(동물유래):염화리소진(기원동물:닭, 사용부위:난백)

**【성 상】** 흰색의 가루가 든 상 연청색불투명, 하 엷은노랑색불투명의 경질캡슐제

**【효능·효과】** 코감기(급성비염), 알레르기성비염 또는 부비동염에 의한 다음 증상의 완화 ; 코막힘, 콧물, 재채기, 눈물, 인후통, 머리 무거움

**【용법·용량】** 성인:1회 1캡슐씩 1일 3회 식후 복용한다. 복용간격은 4시간 이상으로 한다.

**【사용상의 주의사항】**

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
  - 1) 7세 미만의 소아
  - 2) 이약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency)또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
  - 1) 지금까지 약에 의한 알레르기 증상(발진, 발적(총혈되어 붉어짐), 관절통, 천식, 가려움)을 일으킨 일이 있는 환자
  - 2) 고혈압 환자
  - 3) 심장애 환자
  - 4) 녹내장(눈이 아프고 흐릿함)환자, 배뇨곤란 환자
  - 5) 당뇨병, 감상선기능 항진증 환자
  - 6) 지병이 있는 환자, 허약체질인 사람 또는 고열 환자
  - 7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인
  - 8) 고령자(노인)
  - 9) 의사의 치료를 받고 있는 환자
3. 부작용
  - 1) 정신신경계 : 출혈성뇌졸중, 어지러움, 불면, 심한 두통, 신경과민을 일으킬 수 있다
  - 2) 순환기계 : 심계항진(두근거림)을 일으킬 수 있다
  - 3) 소화기계 : 구역, 구토, 구갈(목마름), 변비, 식욕부진이 나타날 수 있다.
  - 4) 피부 : 스티븐스-존슨 증후군(피부점막안증후군), 리엘 증후군(중독성표피괴사증)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 발열, 홍반, 가려움, 안충혈, 구내염(입안염) 등의 증상이 인정되는 경우 및 고열을 동반하는 발진·발적(총혈되어 붉어짐), 화상상의 수종 등 중증(심한 증상)의 증상이 전신의 피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고, 의사 또는 약사와 상의한다. 또한 드물게 이와 같은 중증(심한 증상)의

- 증상을 일으키는 경우에는 즉시 의사의 진료를 받는다.
- 5) 기타 : 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 배노장애가 나타날 수 있다.
4. 일반적 주의
- 1) 이 약의 투여에 의해 졸음이 나타날 수 있으므로 자동차 또는 기계류의 운전조작을 하지 않도록 주의한다
  - 2) 이 약은 극약 성분이 함유되어 있으므로 정해진 용법·용량을 잘 지킨다
  - 3) 수일간 복용해도 증상이 나아지지 않을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
  - 4) 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도, 감독 하에 투여한다.
  - 5) 장기간 계속하여 투여하지 않는다.
5. 상호작용
- 다른 비염(코염)용내복약, 항히스타민제를 함유하는 내복약(감기약, 진해거담약(진해가래약), 진후제, 알레르기용약 등)과 병용(함께 사용)하지 않는다.
6. 저장상의 주의사항
- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다
  - 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.

【포장단위】 자사포장단위

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

- ※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전청(이지드럭→ 보고마당→ 안전성정보→ 의약품유해사례보고)에 알리도록 하십시오.
- ※ 이지드럭(ezdrug.kfda.go.kr)의약품 정보 참조
- ※ 만일, 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되었거나 손상된 제품이 발견된 경우에는 약국 개설자 및 의약품 판매업자에 한하여 교환해 드립니다.



국민 건강을 위해 꾸준히 노력해 온 저희 부광약품은 소비자의 편의를 위해 부광약품이 통화료를 부담하는 소비자 상담실을 운영하고 있습니다. 제품 문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 지금 전화해 주십시오.

♣ 소비자 상담실 : TEL 080-933-2233      ♣ 홈페이지 : <http://www.bukwang.co.kr>

※ 이 첨부문서 작성일자(2010년 11월 12일)이후 변경된 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.