

052115

기침감기약

코리투살[®] 에스 코프 연질 캡슐

※ 사용 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

아세트아미노펜(KP)	200mg
d-메틸에페드린염산염(KP)	12.5mg
덱스트로메토르판브로모화수소산염수화물(KP)	8mg
구아이페네신(KP)	40mg

첨가제(동물유래) : 젤라틴(기원동물 : 소, 사용부위 : 가죽)

【성상】 무색 내지 연한 청색의 투명한 내용물을 함유한 청색의 투명한 장방형 연질캡슐제

【효능·효과】 감기의 증상(여러증상)(인후(목구멍)통, 기침, 가래, 오한출고 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통의 완화

【용법·용량】 만 15세 이상 및 성인 : 1일 3회, 1회 2캡슐 식후30분에 복용 / 만 11세 이상~만 15세 미만 : 1일 3회, 1회 1½캡슐 식후 30분에 복용 / 만 7세 초과~만 11세 미만 : 1일 3회, 1회 1 캡슐 식후 30분에 복용

【사용상의 주의사항】

1. 경고
매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용 하면 간 손상이 유발될 수 있다.

- 2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
 - 2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 천식을 일으킨 적이 있는 사람
 - 3) 만 3개월 미만의 영아(갓난아기)
 - 4) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
- 3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 - 진해(기침을 그치게 함)거담제(가래약), 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복비염(코염)용 경구제, 멀미약, 알레르기용약
 이 약을 복용하는 동안 다음과 같은 행위를 하지 말 것 - 이 약에는 아세트아미노펜이 함유되어 있다. 다른 아세트아미노펜 제품과 함께 복용하여 일일 최대용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용해서는 안 된다.

- 4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의 할 것.
 - 1) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(갓난아기) 및 만 15세 미만의 어린이(구역이나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이저중후군)의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의할 것.)
 - 2) 만 3개월 미만의 영아(갓난아기)에는 복용을 피하고 만 3개월 이상인 경우라도 만 2세 미만의 영아(갓난아기), 유아는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 이약을 복용시키지 않도록 한다. 만 2세 미만 영아(갓난아기), 유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터링해야 한다.
 - 3) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지 천식, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
 - 4) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
 - 5) 간장질환, 신장(콩팥)질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 위십이지장궤양 등이 있는 사람, 고령자(노인), 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
 - 6) 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나 궤양, 출혈문제를 가지고 있는 사람
 - 7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
 - 8) 의사 또는 치과 의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)
- 9. 다음과 같은 기침이 있는 사람 - 흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열-발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

- 5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 삼당 시 가능한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우 - 발진-발적(총혈되어 붉어짐), 가려움, 구역-구토, 식욕부진, 변비, 부종(부기), 어지러움, 불안, 떨림, 불면
 - 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 증상(심한증상) 증상이 나타난 경우
 - ① 속(아니팜락시) : 복용후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다.
 - ② 피부부종(안중후군(스티븐스-존슨중후군), 중독성표피괴사증(리델중후군) : 고열을 동반하고, 발진-발적(총혈되어 붉어짐), 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈 점막에 나타날 수 있다.
 - ③ 천식
 - ④ 간기능장애 : 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨)등이 나타날 수 있다.
 - ⑤ 간질성폐렴 : 기침을 동반하고, 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타난다.
- 3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

- 6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 2) 정기간 계속 복용하지 말 것.
 - 3) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도감독 하에 복용시킬 것.
 - 4) 복용시에는 음주하지 말 것.
 - 5) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것.
 - 6) 비리비탈계 약물, 삼한계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다.
- 7. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관 할 것.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

- 【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 【포장단위】 자사포장단위
- ※ 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- ※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(<http://www.drugsafe.or.kr> → 의약품유해사례보고)에 알려주십시오.
- ※ 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의약품 정보 참조
- ※ 민원, 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되었거나 손상된 제품이 발견된 경우에는 약국 개설자 및 의약품 판매업자에 한하여 교환해 드립니다.



국민 건강을 위해 꾸준히 노력해 온 저희 부광약품은 소비자의 편의를 위해 부광약품이 통화료를 부담하는 소비자 상담실을 운영하고 있습니다. 제품 문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 저금 전화해 주십시오.

☎ 소비자 상담실 : TEL 080-933-2233 <http://www.bukwang.co.kr>

※ 이 첨부문서 작성일자(2015년 05월 21일)이후 변경된 내용은 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.