

▶ 효능·효과

소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 체함, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감

▶ 용법·용량

만 15세 이상의 성인은 1회 1~2정 1일 3회 식후 복용

▶ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 만 7세 이하의 어린이
 - 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
 - 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
 - 3) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
3. 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 이 첨부문서를 소지할 것.

2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우
4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
5. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

허가사항 변경대비표

항목	기 허가사항	변경 사항
효능·효과	소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 식체(위체), 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감	소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, <u>체합</u> , 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감
용법·용량	15세 이상의 성인은 1회 1~2정 1일 3회 식후 복용	<u>만</u> 15세 이상의 성인은 1회 1~2정 1일 3회 식후 복용
사용상의 주의사항	<p>1. <u>다음 환자에는 투여하지 말 것.</u></p> <p>이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.</p> <p>2. <u>다음 환자에는 신중히 투여할 것.</u></p> <p><u><추가></u> <u><추가></u> 다른 약물을 <u>투여받고</u> 있는 환자</p> <p>3. <u>일반적 주의</u></p> <p>1) <u>정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.</u></p> <p>2) <u>2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.</u></p> <p>4. <u>소아에 대한 투여</u></p> <p><u>이 약은 7세 이하의 영·유아에게 투여하지 않는다.</u></p>	<p>1. <u>다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.</u></p> <p><u>1) 만 7세 이하의 어린이</u></p> <p><u>2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.</u></p> <p>2. <u>다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.</u></p> <p><u>1) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람</u></p> <p><u>2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성</u></p> <p><u>3) 다른 약물을 복용하고 있는 사람</u></p> <p>3. <u>다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 이 첨부문서를 소지할 것.</u></p> <p>2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우</p> <p>4. <u>기타 이 약의 복용시 주의할 사항</u></p> <p><u>정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.</u></p>

제품명: 복합파자임이중정

<p>5. 저장상의 주의사항</p> <p>1) <u>소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.</u></p> <p>2) <u>직사광선을 피하고 되도록이면 서늘한 곳에 보관한다.</u></p> <p>3) <u>오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.</u></p>	<p>5. 저장상의 주의사항</p> <p>1) <u>어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.</u></p> <p>2) <u>직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.</u></p> <p>3) <u>오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.</u></p>
--	---